

MORTALIDAD 2010

La esperanza de vida al nacer es de 76.3 años. En las mujeres es de 78.8 y en los hombres de 73.8 años, esto es, las mujeres viven en promedio casi 5 años más que los hombres.

En el grupo de 15 a 29 años ocurrieron 248 muertes de varones por cada 100 mujeres; en tanto que en el grupo de 60 y más años la relación es de 83 por cada 100 mujeres

DEFUNCIONES POR SEXO Y EDAD

En general fallecen más hombres que mujeres. En 2008 se registraron 103 defunciones de hombres por cada 100 mujeres. Por grupos de edad, las diferencias por sexo son aún más significativas, es decir, en todos los grupos se aprecia una mayor cantidad de fallecimientos de varones, excepto en el grupo de 60 años y más donde hay una mayor cantidad de mujeres fallecidas.

Destaca el grupo de 15 a 29 años donde ocurrieron 248 muertes de varones por cada 100 mujeres; en tanto que en el grupo de 60 y más años la relación es de 83 por cada 100 mujeres.

Sobremortalidad masculina según grupos de edad, 2008


Grupos de edad	Hombres por cada 100 mujeres
Total	103.3
0 a 14 años	129.5
15 a 29 años	248.3
30 a 59 años	164.5
60 y más años	82.7

Fuente: **INEGI**. Estadísticas vitales 2008. Base de datos.

Las enfermedades crónicas degenerativas, como la diabetes mellitus, es la principal causa de muerte en la entidad, la cual muestra una mayor incidencia en las mujeres (17.7%), esto es, 1.7 puntos porcentuales más que los hombres. Le sigue el infarto agudo del miocardio con la misma proporción en ambos sexos (11.2%), estos dos padecimientos en conjunto representan en cada sexo poco más de la cuarta parte, 27.2% para hombres y 28.9% para mujeres.


Las enfermedades alcohólicas del hígado es la tercer causa de muerte en los hombres (3.4%), mientras que en las mujeres son las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (3.3 por ciento).

Distribución porcentual de las defunciones por principales causas según sexo, 2008



FUENTE: INEGI. Estadísticas vitales 2008. Base de datos.

Causas de Muerte en mujeres y hombres en el DF




DEFUNCIONES DE MUJERES DE 15 AÑOS Y MÁS

De las 24 mil 237 defunciones registradas de mujeres de 15 años y más, 79 de cada 100 ocurrieron entre las mayores de 59 años.

Las causas de mortalidad por grupos de edad presentan diferencias importantes. Entre las jóvenes (15 a 29 años), 12.2% falleció a causa de un accidente de transporte; 6.1% por lesiones autoinfligidas; 5.4% por causas obstétricas directas y 5.2% por agresiones.

Distribución porcentual de las defunciones de mujeres de 15 y más años por grupos de edad, 2008



Fuente: **INEGI**. Estadísticas vitales 2008. Bases de datos.

Para el grupo de 30 a 59 años, la diabetes mellitus es motivo de poco menos de una quinta parte de las defunciones en este grupo, le siguen tumor maligno de la mama con 6.9% e infarto agudo del miocardio 5.4 por ciento.

La población femenina de 60 años y más, tuvo como principales causas de muerte la diabetes mellitus con 19 de cada 100 decesos, a la vez que 14 de cada 100 fueron por infarto agudo del miocardio.

Distribución porcentual de las defunciones de mujeres de 15 y más años por principales causas de muerte según grupos de edad, 2008

Principales causas de muerte en mujeres


Jovenes (15 a 29 años)	100.0
Accidentes de tráfico de vehículos de motor	12.2
Lesiones autoinfligidas intencionalmente	6.1
Causas obstétricas directas	5.4
Las demás causas	76.3
Adultos (30 a 59 años)	100.0
Diabetes mellitus	17.4
Tumor maligno de la mama	6.9
Infarto agudo del miocardio	5.4
Las demás causas	70.3
Adultos mayores (60 y más años)	100.0
Diabetes mellitus	19.3
Infarto agudo del miocardio	13.6
Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	4.2
Las demás causas	62.9

Fuente: **INEGI**. Estadísticas vitales, 2008. Base de datos.

DEFUNCIONES DE HOMBRES DE 15 AÑOS Y MÁS

De las 24 mil 708 defunciones de hombres de 15 años y más, 6 de cada 10 se registraron entre la población mayor de 60 años.

Distribución porcentual de las defunciones de hombres de 15 y más años por grupos de edad, 2008



Fuente: **INEGI**. Estadísticas vitales 2008. Bases de datos.

En los hombres, las causas de la muerte difieren con la edad. En el grupo de 15 a 29 años, las agresiones constituyen 18.9% de los decesos, los accidentes de transporte 17.7%, en conjunto significan poco más de una tercera parte de las muertes en este grupo de edad; también destacan las enfermedades por virus de la inmunodeficiencia humana (6.6 por ciento).

Distribución porcentual de las defunciones de hombres de 15 y más años por principales causas de muerte según grupos de edad, 2008

Principales causas de muerte en hombres

Jóvenes (15 a 29 años)	100.0
Agresiones	18.9
Accidentes de tráfico de vehículos de motor	17.7
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana	6.6
Las demás causas	56.8
Adultos (30 a 59 años)	100.0
Diabetes mellitus	17.2
Infarto agudo del miocardio	8.9
Enfermedad alcohólica del hígado	7.7
Las demás causas	66.2
Adultos mayores (60 y más años)	100.0
Diabetes mellitus	18.3
Infarto agudo del miocardio	14.3
Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	4.8
Las demás causas	62.6

Fuente: **INEGI**. Estadísticas vitales, 2008. Base de datos.

En el grupo de 30 a 59 años, la mayoría de las defunciones fueron ocasionadas por la diabetes mellitus (17.2%), 8.9 por infarto agudo del miocardio; 7.7% por enfermedad alcohólica del hígado; 6.1% por agresiones y 5% se deben a enfermedad por el virus de la inmunodeficiencia humana.

A partir de los 60 años prevalecen como las dos principales causas de muerte las mismas del grupo de 30 a 59 años, incluso la proporción de ellas se incrementa considerablemente, tal es el caso de las defunciones por infarto agudo del miocardio que en los adultos mayores es de 14.3 por ciento.

SUICIDIOS

Un caso especial es el de los suicidios; en el 2008 ocurrieron 329, que equivalen a 3.7 suicidios consumados por cada 100 mil habitantes en la entidad¹. El 74.5% de los suicidios fue de hombres, por 25.5% de mujeres. Por cada dos mujeres suicidas hubo cinco hombres que incurrieron en este hecho.

La mayor parte de las defunciones por lesiones autoinfligidas intencionalmente sucedieron entre la población de 30 y 59 años, éstas representan 51% del total de suicidios. El 36.5% se da entre los jóvenes de 15 a 29 años. Entre la población de 60 y más años es de 8.5 y 4% en los niños menores de 15 años.


Datos VIH 2010.

DEFUNCIONES POR CAUSA DE SIDA

En el Distrito Federal, en el año 2008 ocurrieron 508 defunciones causadas por la enfermedad del virus de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA), 15 menos que en 2007. El monto de decesos por dicha enfermedad significa 1% del total de fallecimientos, ubicándose dentro de las primeras 15 causas de muerte. De las defunciones por SIDA, 90.4% fue de hombres (459) y 9.6% de mujeres (49).

En relación con la tasa de mortalidad observada por sexo, la brecha entre hombres y mujeres tiende a disminuir. En 1998, 17.1 de cada 100 mil defunciones en la población masculina eran atribuidas al SIDA y entre las mujeres era de 1.7 de cada 100 mil. En el transcurso de diez años, la tasa de mortalidad observada se ha reducido, mostrando en los varones un decremento mayor en comparación con las mujeres.

Tasa de mortalidad observada por SIDA para cada sexo, 1998-2008
Por cada 100 mil habitantes



Fuente **INEGI**. Estadísticas de mortalidad. Base de datos.
México en cifras. Indicadores de población.

¹ Para el cálculo se toma la población estimada a mediados de 2008 por el CONAPO.